

ホスレノールチュアブル錠

〈お薬服用の患者さまへ〉

1. このお薬は溶けません。食事の直後に、10回を目安に噛み砕いて服用してください。

- このお薬は、口中で細かく噛み砕くことで、十分な効果を得ることができます。そのため、必ず噛み砕いて服用してください。
- このお薬は、食事中に含まれるリンとおなかの中で結合することによって、便と一緒にリンを体の外に出します。食事をとらなかった場合、このお薬の効果は期待できません。
- このお薬による、はき気・おうとは、食事の直後に服用すると減少することが知られています。
- このお薬は、水なしで服用できるように工夫された錠剤です。細かく噛み砕いた後は、唾液または必要であれば少量の水で飲み込んでください。

(裏面につづく)

バイエル薬品株式会社

- 激しい腹痛もしくは腹痛がおさまらないといった症状を訴える患者さまの中には、十分噛み砕けなかった方が一部いらっしゃいます。これらの症状との因果関係は不明ですが、このお薬をそのまま噛み砕かずに服用することはお避けください。
- 噛み砕くことが困難だと感じられた方は、医師または薬剤師にご相談ください。

2. シート内で錠剤が割れたり、欠けたりしている場合でも、1回分の錠剤をすべて服用してください。

- このお薬は、噛み砕きやすいように工夫されています。このため持ち運びの際に割れたり、欠けたりすることがありますが、薬の効果に影響はありません。

3. 腹部レントゲン検査を受診される場合、この薬の影が映ることがあります。先生にこのお薬を服用していることをお伝えください。